

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百四十一

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣王鍾泰

謄錄監生臣崔鶴立

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十

明周王朱橚撰

傷寒門

治傷寒心腹脹痛論

夫傷寒心腹脹痛者其中人臟腑久冷因染斯疾未得汗間心神煩熱遂服涼藥及飲冷水傷於心脾動於風冷故令心腹脹痛也或有經吐下已後不解内外有熱亦心腹脹痛此為内有結實故也歌曰腹痛腎兮通脈湯

肺魚表症桂加黃實疼使結虛痢利脹則陳皮梗下良
又論云邪在裏陽邪入裏與正氣搏則為腹痛所以痛
者有異焉脈實腹痛滿大閉者實痛也脈虛腸鳴而大
便泄者虛痛也陰陽異症用藥不同大抵痛為邪氣實法
當疎利陰受病則只宜用養正丹輩溫而利之少陰腹
痛四逆或欬或悸或小便不利或泄利下重四逆散下
利清穀脈微欲絕通脈四逆湯腹痛小便不利用真武
湯誤下太陽因而腹滿時痛是有表復有裏為太陰太

陽俱病用桂枝芍藥湯痛甚桂枝加大黃湯實痛者關
脈實煩燥腹滿大便閉結桂枝加大黃湯小承氣湯胸
中熱胃中邪氣腹痛欲嘔吐則用黃連湯虛痛者寸脈
濡尺脈閉腸鳴泄利先與小建中湯不瘥小柴胡去黃
芩加芍藥投之間用建中湯加遠志腹中冷痛四肢厥逆
用薑附湯腹脹者陰陽不和也桔梗半夏湯最良活人
書云本太陽病醫反下之因而腹滿時痛病有表有裏
仲景所以用桂枝加芍藥湯主之痛甚者加大黃桂枝

加芍藥即是小建中也太陰脈弱自利設當行大黃芍藥者宜減之其人胃虛陽氣易動故也下利者先煎芍藥十餘沸難經云痛為實大抵痛宜下仲景云發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯又曰腹中滿痛此為實當下之屬大柴胡湯腹痛有二症有熱痛有冷痛尺脈弦腸鳴泄利而痛者冷痛也小建中湯主之仲景云陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不瘥者與小柴胡湯小柴胡去黃芩加芍藥陰症腹痛即四逆

散通脉四逆加芍藥腹小便利者真武湯也關脈實
腹滿大便閉澀按而痛者實痛也桂枝加大黃湯黃連
湯大承氣湯主之又有腹脹滿者何也陰陽不和也桔
梗半夏湯最良仲景論太陽症發汗復腹脹滿者厚朴
生薑半夏甘草人參湯下後心煩腹滿卧起不安者梔
子厚朴湯吐後腹脹滿者與調胃承氣湯少陰病六七
日腹脹不大便者急下之宜承氣湯也

方

厚朴散

出聖惠方

治傷寒因有熱服冷藥過度心腹脹痛

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟一兩

當歸

剉微炒

枳殼

麤炒微黃去穢

木

香

大腹皮

剉各半兩

訶梨勒

煨用皮一兩

右粗搗篩每服四錢水中盪入生薑半分煎六分

去滓不計時候稍熱服

木香散

出聖惠方

治傷寒冷氣積在腹中脹滿疼痛

木香

枳殼

麤炒微黃去穢

柴胡

去苗

當歸

剉微炒各三分

乾薑

炮製

剉半兩

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒一分

右粗搗篩每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分去滓稍熟不計時候服一方吳茱萸用生薑半分同

煎

桃仁散

出聖惠方

治傷寒心腹脹滿疼痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

枳殼

麩炒微黃去核

神麴

炒令微黃

麥蘖

炒令微黃各三分

桂心

白朮

各一兩

右為粗散每服三錢水一中盞煎六分去滓稍熟不

計時服之

當歸散

出聖惠方

治傷寒脾胃虛心腹脹痛不思飲食

當歸

劉微炒

乾薑

炮製劉各半兩

桂心

芍藥

陳皮

湯浸去白

穠 煨 檳榔

各一兩

右為散每服三錢以水一中盞煎六分去滓稍熱不

計時候服

赤芍藥散

出聖惠方

治傷寒脾胃氣滯心腹脹痛不欲飲食

赤芍藥

訶梨勒

煨用皮

當歸

劉微炒

肉苳菴

去殼

人參

去蘆頭

郁李仁

湯洗去皮尖微炒

桂心

各三分

陳橘皮

湯浸去白穢焙

檳榔

各一兩

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去

滓不計時候溫服

柴胡散

出聖惠方

治傷寒發汗氣壅不散攻心脹痛

柴胡

去苗

黃芩

赤芍藥

檳榔

各三分

枳殼

麤炒微黃去穢

半夏

湯洗七遍去滑

大腹皮

剉

木香

各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎六分

去滓不計時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治傷寒卒心腹脹滿不下飲食

赤茯苓

桔梗

去蘆頭

陳橘皮

湯浸

人參

半兩去蘆頭

檳榔

分三

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去

滓稍熱不計時候服

大黃丸

出聖惠方

治傷寒大腸氣壅心腹脹滿疼痛四肢骨

節酸疼煩悶不得眠卧

川大黃

一兩剉碎微炒

木香

桂心

甘草

炙微赤剉各一分

枳

殼

麩炒微黃去核

檳榔

各半兩

郁李仁

三分湯浸去皮尖微炒

右為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以溫酒服下三十丸以利為度

治傷寒冷氣攻心腹脹滿疼痛不下飲食方

出聖惠方

木香

赤芍藥

厚朴

去粗皮生薑汁炙令香熟各三分

甘草

一分

炒微赤判

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

桂心

乾薑

炮製判

白朮

青橘皮

湯浸去白穢焙各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎六分去

滓不計時候稍熱服

半夏散

出聖惠方

治傷寒心腹脹滿疼痛胸膈壅滯或嘔噦

不能飲食宜服

半夏

湯洗七遍去滑

前胡

去蘆頭

訶梨勒皮

赤芍藥

人

參

去蘆頭各三分

桂心

木香

檳榔

各半兩

陳橘皮

一兩湯浸

去白穰

穰

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分

去滓稍熱不計時候服

厚朴散

出聖惠方

治傷寒汗後腹脹疼痛

厚朴

二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

川大黃

剉碎微炒

人參

去蘆頭各一兩

芍藥

赤芍藥

陳橘皮

湯浸去白穢各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分

去滓稍熱不計時候服

桃仁湯

出聖濟總錄

治傷寒後心腹脹痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒令黃

陳麴

炒

大麥蘖

炒

桑皮

各一兩

白

朮

桂

去粗皮各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎半盞去滓食前溫服
烏藥散 治厥陰病脇脹引小腹而痛者此為疝也

烏藥 茴香 青皮 赤豆 乾漆 沒藥

各一兩 各二兩

兩 硃砂 滑石 高良薑

各一兩

右除硃砂別入搗篩為散取一盞溫酒或白飲和服
仍以鈴按伏之患釋

柴胡芍藥湯

出聖濟總錄

治傷寒發汗後邪熱不除腹脇脹

痛

柴胡

去苗

芍藥

黃芩

去黑心 各三分

大腹皮

半夏

湯洗 去滑

炒

枳殼

去穰 麩炒 各半兩

檳榔

剉一分

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎同煎
至半盞去滓溫服又治傷寒發汗惡氣心腹脹滿
以薄荷煮汁服大解利之

傷寒厥逆

論

夫傷寒病手足逆冷其名曰厥此因陽氣衰陰氣盛陰
盛則陽脈逆而不通于四肢所以逆冷其症令人惡寒

不飲水下利清穀或清便自調或小便數症默靜是其
候也宜溫之灸之若灸之而手足不溫者為難治然厥
亦有熱厥者先發熱而後厥熱深厥亦深熱微厥亦微
脈雖沈伏按之當滑若或畏熱或飲水揚手擲足煩躁
不得眠大便閉小便赤外症昏憤者雖厥不可溫也宜
下之 陰陽相乘而生寒熱厥者脈症似同而大異寒
厥者初得之四肢冷脈沈微而不數多惡寒引衣自覆
下利清穀外症多惺熱厥者初得之必發熱頭疼脈雖

沈伏按之必數其人或畏熱喜冷揚手掉足煩躁不眠
大小便閉赤外症多昏冒傷寒亦然治之各有方 傷
寒厥者冷也甚於四逆也經曰厥有陰陽氣不相順接
便為厥厥者手足逆冷是也謂陽氣內陷熱氣逆伏而
手足為之冷也經曰傷寒一二日至四五日厥者必發
熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微是知
內陷者手足為厥矣少陰病但厥無汗而強發之必動
其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上

竭亦是言發動其熱也先熱而後厥者熱伏於內也先厥而後熱者陰退而陽氣得復也若始得之便厥者則是陽氣不足而陰氣勝也大抵厥逆為因所主寒者多矣而又有進退之別經曰病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈發熱四日厥反三日厥少熱多其病自愈厥畏熱反厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故病進也病至厥陰傳經盡也當是之時陽氣勝陰厥少熱多其病則愈若或陰氣反勝陽不得復厥多熱少

其病則逆厥為陰氣至也熱為陽寒復也至於下利則
曰先厥後發熱而利必自止見厥復利厥者復為熱為
陽氣得復而利必自止熱者復為厥是陰氣還勝也故
復下利矣諸陽受氣於胸中邪氣客感於胸中鬱鬱留
結則陽氣不得敷布而手足為之厥經曰手足厥冷脈
乍緊邪結在胸中必中滿而煩饑不能食病在胸中鬱
結者是矣厥為陰之盛也若更加之惡寒而倦者陰氣
之極也則難治治經曰少陰病惡寒身倦而利手足厥

冷者不治是厥冷之逆者神丹不能救也

厥有二症有陰厥有陽厥

仲景所謂熱深則厥深也蓋陽極則發厥也不可一例作陰症治之初得病而身熱至三四日熱後氣方深大便閉小便赤或譫語煩躁昏憤及別有熱症而反發厥者陽厥也急用大柴胡湯大承氣湯隨輕重用之若有大段輕者白虎湯初得病身不寒熱大便不閉引衣自蓋或下利或小便數無熱症而厥逆者陰厥也四逆湯理中湯通脈四逆湯當歸四逆加茱萸生薑湯陰陽二厥脈皆沉所以最難辨也陰厥脈沉遲而弱陽厥脈沉而滑或去繁又陽厥指爪時時溫陰厥常冷也症治論云若兩脈不見者只以外症辨冷熱也若未辨陰陽者且與四順丸試之若是陽厥則當見熱症若是陰厥不發熱矣手足指頭微寒者謂之清此疾為輕只可服理中之類已成厥者則用四逆也脈不至者通脈四逆等湯厥而脈乍結者邪氣結在胸中也亦令人厥爪蒂散

吐法厥而怔忡者有水也
宜洗治水屬厥陰藏厥

傷寒四逆四肢逆而不溫者是

也積涼成寒積溫成熱非一朝一夕之故其所由來者漸
矣傷寒始者邪在皮膚當太陽陽明受邪之時則一身手
足盡熱當少陽太陰受邪之時則手足自溫是表邪漸緩
而欲傳裏也經曰有傷寒四五日手足溫而渴者小柴胡
湯主之是太陽之邪傳之陽也傷寒脈浮手足自溫者其
病係在太陰是少陽邪傳於太陰也是知邪氣在半表半
裏則手足不熱而自溫也至於邪傳少陰而裏症已深雖

未至厥而手足又加之不溫是四逆也若至厥陰則手足厥冷矣經曰少陰病四逆其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之方用柴胡枳實芍藥甘草四者皆是寒冷之物而專主四逆之疾是知四逆非虛寒之症也又有四逆諸湯亦治四逆手足寒方用乾薑附子熱藥者其旨微矣若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也四逆散主之若始傳之手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯溫之然須識此

勿令悞也四逆與厥相近而非也經曰諸四厥者不可下是四逆與厥者異也吐利煩躁見四逆者死是難治者四逆也診視之間宜詳究之歌曰四逆須將腎症詳病來手足但微涼枳芎藥傳經劑邪中陰經四逆湯又論云手足不溫謂之四逆陰經之邪主之太陰受病手足自溫傳至少陰則有手足四逆之症四逆之與厥冷實相遠也或曰均是四逆耳而四逆湯散一寒一熱用藥何不類耶蓋手足自熱而至溫由溫而至四逆

是傳經之邪非虛寒之候也四逆散主之若得病已來手足不溫便成厥逆此則陰經受邪陽氣不足也可以四逆溫之臨診要當審此雖然吐利煩惡見四逆四逆下利惡寒而倦並屬少陰又為不治之診故併及之少陰四逆其人或咳或悸或小便不利或腹中痛滿或泄利下重並用四逆散初病以來厥冷四逆即用四逆湯溫之兩足脛逆冷有本條九厥逆冷厥初來厥有源沈遲而弱冷常存熱深發厥初身熱沈滑時平指爪溫陽

氣伏藏陰氣越出陰陽不相接所以厥也其手足厥冷之症乎蓋諸陽會於四肢陽微而為陰所勝初病便厥者是為冷厥其脈沈遲按之則弱醒醒而靜惡寒引衣足多攣卧或身上粟形或下利清穀也熱伏於內失熱而後厥者是為熱厥脈閉沉滑按之則數昏塞狂言發渴露手揚衣或燥不得眠或大便不得利也外症皆可驗之若先厥而後得熱是則陰邪退而陽氣復矣傷寒熱多厥少其病當愈厥多熱少其病則延下利則發厥

一條亦厥者復為熱為有瘳熱者復厥為已甚蓋下虛則厥陰實使之陽長陰消可治也雖然傷寒血症亦有四肢厥以至昏迷悶絕者此又不可知至若少陰下利惡寒而拳手足厥冷與胃臟厥一症皆為不治之診厥之為厥可無辨乎冷厥初病便作四肢逆冷足攣惡寒引衣自蓋白通湯大小便而有滑泄外症默默而醒四逆湯理中湯白通加豬膽湯當歸四逆湯加茱萸生薑湯可選諸方用之又痰厥氣厥腎厥宜用易簡芎辛湯

最良熱厥初病身熱然後發厥其人則畏熱揚手擲足
及煩躁飲水頭汗大便閉小便赤悌鬱昏憤蓋當下失
下血氣不通故四肢逆冷所謂熱深則厥深下症悉具
而見厥逆者此也可與大承氣湯及大柴胡湯或白虎
湯熱厥與冷厥相類但指爪時溫為異耳若疑似尚未
的當且以四順丸試之陽厥則有熱陰厥則無熱寒熱
而厥者一手或兩手無脈面色閤昧不澤急投五味子
并麻黃細辛甘草湯人參調血通脈可以為佐服無汗

解則生投藥無汗或脈不至者不治水氣厥者心下怔忡可用茯苓甘草湯邪氣結胸中而厥者脈乍緊結乍心煩滿飢不欲食可與瓜蒂散吐之臟厥者七八日逆冷下利發躁無時暫安則不能治痰飲厥逆眩運少與三牲飲妙

方

吳茱萸湯

出聖惠方

治傷寒吐利手足逆冷心煩悶絕宜服

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

甘草

一分炙微赤剉

棗五枚

生薑

人參

去蘆頭

厚朴

各半兩去粗皮塗生薑汁炙香熟

右都細剉以水三大盞半煎至一盞半去滓不計時

候分溫四服

益智子散

出聖惠方

治傷寒曾經發汗吐下寒氣未退脾胃

氣虛胸膈煩滿手足逆冷宜服

益智子

川烏頭

炮製去皮臍

肉桂

去皮

當歸

剉微炒

乾薑

炮製剉

細辛

高良薑

剉

甘草

炙微赤剉各半兩

前胡

去蘆頭

厚朴

各一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至

六分去滓不計時稍熱服

通脈散

出聖惠方

治傷寒病脈沉厥逆宜服

麻黃

一兩半
去根節

肉桂

去皴皮

附子

各二兩炮
製去皮臍

甘草

半兩
炙微

赤劉

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎六分去滓不計時稍熱服

治傷寒吐下之後胃氣虛寒食即吐逆四肢厥冷宜服

此方

出聖
惠方

人參

去蘆
頭

白朮

桂心

附子

炮製去
皮臍

厚朴

各一
兩去

粗皮塗生薑
汁炙令香熟

乾薑

炮製
剉

陳橘皮

湯浸去
白穢焙

甘草

各三
分炙

剉
微赤

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓不

計時候稍熱服

附子散

出聖
惠方

治傷寒手足厥冷脈細欲絕者宜服

附子

炮製去
皮臍

白朮

各一
兩

高良薑

各二
分剉

厚朴

一兩半
去粗皮

生薑汁炙

令香熟

甘草

一分炙
微赤剉

右搥篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候稍熱服

白木湯

出聖
惠方

治傷寒四逆手足厥冷汗出脈微及內有

久寒

白朮

一兩半

人參

三分去
蘆頭

桂心

乾薑

各半兩
炮製剉

附子

一兩炮製去皮

甘草

一分炙微赤
一作三分

臍一作半兩

右搥篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓

不計時候稍熱服

附子湯

出聖惠方

治傷寒大熱出汗熱不去腹內拘急四肢

厥冷并不利方

甘草

炙微赤剉

乾薑

炮製剉

赤芍藥

各一兩

附子

半兩炮製去皮臍

右搗篩為散每服五錢以水一大盞半煎至一盞去

滓不計時候稍熱服

治傷寒手足厥逆嘔吐涎沫頭痛宜服此方

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

人參

一兩去蘆頭

右搗篩為散每服三錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時稍熱服

芍藥湯 治傷寒下利清穀裏寒外熱汗出而厥腹痛

魚嘔

芍藥

一兩

附子

炮製去皮
臍三分

人參

甘草

炙各
半兩

右剉如麻豆每服五錢水一中盞半入生薑半分拍碎同煎八分去滓服日晚再服

吳茱萸湯 治傷寒手足厥冷脈細欲絕者

吳茱萸

湯淘三遍
焙乾炒

當歸

切
焙
各一兩

甘草

炙三分
乾

薑

炮製
半兩

桂

去粗皮
一兩

細辛

去苗葉
三分

右粗搗篩每服五錢水一盞酒半盞棗三枚擘破同

煎八分去滓溫服

人參湯 治傷寒裏寒外熱手足多厥

人參 白朮

各一兩

細辛

去苗葉

乾薑

炮製三分

甘草

炙赤半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前

溫服

陽起石丸 治傷寒四逆

陽起石 太陰玄精石 硝石 附子

炮製去皮
臍各等分

右搗篩研為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服

五丸至十丸新汲水下汗出解

正陽丸 治傷寒手足厥冷脈沉細

方見本門
陰毒類

澤漆湯 治脈沉者

半夏

半升

紫參

五兩一作紫苑

澤漆

三斤以東流水五斗煮取一斗五升

生薑

五兩

白朮

五兩

甘草

黃芩

人參

桂枝

各三兩

右咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡

青龍湯

下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣

從小腹上衝胸咽手足痺其面翕如醉狀因腹下流
陰股小便難時復嘔者與茯苓桂心甘草五味子湯
治其氣衝

茯苓

四兩

桂心

甘草

各二兩

五味子

半升

右咬咀以水八升煮取三升去滓分三服溫服

衝氣即低而反更咳胸滿者用茯苓甘草五味子去桂

加乾薑細辛以治其咳滿方

五味子

半升

甘草

乾薑

細辛

各一兩

茯苓

去黑皮四兩

右咬咀以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

咳滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也服之當逆渴而渴反止者為支飲也支飲胸當冒冒者必嘔嘔者復用半夏以去其水力

半夏

五味子

各半升

茯苓

四兩

細辛

乾薑

甘草

各二

兩

右咬咀以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

水去嘔止其人形腫者應用麻黃以其人遂痺故不用

麻黃用杏仁方

出千金方

杏仁 五味子

半夏

各半升

茯苓

四兩

乾薑

細辛

甘草

各三兩

右咬咀以水一升煮取三升去滓溫服半升日三若

逆而用麻黃者其人心厥所以然者以其人血虛

麻黃發其陽故也

若面熱如醉此為胃熱上衝其面加大黃利之方

大黃 乾薑 細辛 甘草 茯苓 五味子

四兩

半夏 杏仁

各半升

右咬咀以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三

咳而上氣肺脹其脈浮心下有水氣脇下痛引缺盆設

若有實者必躁其人常倚仗小青龍加石膏湯主之

方

石膏 乾薑 桂心 細辛 芍藥 甘草

各二兩

各二

兩
麻黃四半夏半五味子一

兩

升

升

右咬咀以水一斗先煮麻黃減二升下藥煮取二升
半強者服一升羸者減之小兒四合仲景常用治
肺脹咳而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水外臺
秘要同

赤丸方 治傷寒氣厥逆

茯苓 半夏

各四兩洗
一方用麴

烏頭二兩

細辛一兩一
作人參

右為末用真珠砂為衣煉蜜丸如麻子大先食酒飲

下三九日夜一服不知稍增之以知為度

附子散 治傷寒時氣

附子

炮裂去皮臍

桂

去粗皮各半兩

右搥羅為散每服三錢熱酒調頓服厚衣蓋汗出為度

奪命川附湯 治體虛感冒傷寒頭痛發熱或日輕夜

重或午或早或晚或終日單發大熱雖渴不喜冷脈沈細氣虛者可服予嘗以此藥醫十數人凡所醫者

皆效故錄附之

川附

一雙去皮
臍炮切片

右咬咀作一服水一碗生薑十三片煎七分濾出水
中沈冷再露一宿次早五更冷服一二口暫停看
腹中有無發熱如無熱再進作二三次服其熱自
退其效神速

四逆湯 治傷寒厥逆表熱裏寒下利清穀食入則吐
或乾嘔或大汗大吐下之後四肢冰冷五內拘急舉

體疼痛不渴脈沉伏

大附子

生用去皮
臍半兩

乾薑

半兩

甘草

炙一兩

右剉散每服四錢水二盞煎七分去滓食前溫服連

進取效

返陰丹

出王氏
博濟方

治傷寒厥逆

太陰玄精石

一兩
為末

硫黃

一兩
為末

硝石

一兩
為末

膩粉

半兩

右依次第放在乾熨斗內用濃墨染紙作蓋子覆之

以慢火煨久揭看藥上有黃芽生便止入乳鉢內

閉氣細研五七百下用蒸餅九如皂子大傷寒脈
細四肢冷逆及曾轉瀉者濃煎艾湯一盞先熱與
喫一半細嚼一九下須臾汗出便差重者不過二
九必愈

傷寒後不得眠

論

夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜主卧謂陽氣盡陰
氣盛則目瞑矣今熱氣未散於諸陽所以陽獨盛陰偏
虛今病後不得睡者陰氣未復故也 榮衛之氣晝行

於陽則寤夜行於陰則寐傷寒差後臟腑皆虛榮衛出入不能循常緣熱邪未散與陽氣并衛氣獨行於陽入陰則陽盛陰虛故不眠歌曰不眠腎症利而煩大熱膀胱胃裏乾吐汗出下餘懊懷熱多熱少數般看 經云胃不和卧不安不和者津液乾焦邪熱煩躁陽獨盛而陰偏虛故爾盖夜以陰為主陰盛則目閉而卧安惟夫陰為陽奪故終夜煩擾而不得寧所謂陰虛夜不靜者此也若陽虛而陰反盛又有夜靜晝煩之症矣少陰不

利而渴不得眠猪苓湯此停水也若二三日以上心煩
不得眠黃連阿膠湯主之甚良太陽發汗多或大汗出
胃中乾煩熱不得眠欲飲水者與之和胃即愈矣若脈
浮小便不利渴可與五苓散吐汗下後心中懊懣虛煩
顛倒不得眠梔子豉湯或酸棗湯大熱乾嘔呻吟錯語
不得眠黃連解毒湯凡陽毒熱病皆不得眠下後發汗
無大熱脈微沈不嘔渴無表症夜靜晝煩而不得眠可
與乾薑附子湯陽勝陰則狂眠亂夢可與梔子豉湯陰

勝陽則驚悸昏沉宜用酸棗湯瘥後不得眠者熱氣與諸陽相併陰氣未復故也宜用梔子烏梅湯或湯簡溫膽湯加竹茹此可通用又多眠歌曰神昏多睡病堪憐汗風溫默默然狐惑唇瘡腎脉弱太陽浮細亦癡眠陰邪陽盛人多昏默昏昏閉目者陰司闔也默默不言者陰主靜也多眠四症二者病在經若太陽惡寒其脈浮細是陽氣未盡復也若狐惑淹沉素得之下利則不亡陽可知矣此所以為陰盛與風溫症尺寸俱浮自汗喘

息體重不收嘿嘿然欲眠不可發汗可與葠蕒湯病在少陰厥陰二經孤感經四肢沉重咽乾聲啞上下唇瘡害人甚急有本條少陰症尺寸俱沉細且欲寐急與四逆湯復其陽氣又少陰欲吐不吐煩而多寐五六日自利而渴張氏無治法若是少便白者可用四逆湯甚妙張氏又云少陰病脈微沉細多寐汗出不煩欲吐若變症者五六日自利煩躁及不得寐者死少陰症變難活貴乎詳審而治之也太陽症頭痛惡寒嗜卧脈浮細或

胸脇滿者宜用小柴胡湯脈且浮宜麻黃湯胃傷風發
黃嗜卧自有本條嘗為歌云差後昏沉似伏妖或時寒
熱或時潮語言錯謬精神少毒在心胸汗未消傷寒差
半月以來終不能惺惺謬錯言語精神短少或寒或熱
似瘧或潮熱頰赤醫者若以風魅治之非也是由發汗
不盡餘毒在心胞絡間使之然也瘧後沉昏不醒可與
知母麻黃湯再取微汗瘧後勞復食復見下後有熱條
瘧後胃脘餘熱虛煩而吐用竹葉湯加生薑差後喜睡

膈上有寒宜用理中丸差後從腰以下有水氣宜用牡
蠣澤瀉散差後日暮微煩以其病方差強與穀食而不
消也節飲則可愈矣

方

麥門冬散

出聖惠方

治傷寒後體虛煩熱不得睡卧少思飲

食宜服

麥門冬

去心

黃芩

各三分

茯神

熟乾地黄 人參

去蘆

頭

黃耆

剉各一兩

甘草

炙半兩微赤剉

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗
三枚粳米五十粒煎至五分去滓不計時候服

治傷寒後虛煩不得眠睡心中懊憹宜服梔子烏梅湯

出活
人書

甘草

炙微赤對

梔子仁

黃芩

各半兩

烏梅肉

十四枚微炒

柴

胡

一兩去苗

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分竹
葉二十七片豉五十粒煎至六分去滓不計時候

溫服

熟乾地黄散

出聖惠方

治傷寒後體虛心煩不得眠卧四肢

少力

熟乾地黄

半兩

白芍藥

羚羊角屑

茯神

黃

耆

劉麥門冬

酸棗仁

微炒

人參

去蘆頭

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓入

鷄子清一枚攪令勻溫服

又方

出聖惠方

半夏

三分湯洗
七遍去滑

白茯苓

一兩半

黃芩

一兩

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分粳

米五十粒煎至五分去滓溫服

酸棗仁散

出聖惠方

治傷寒後體虛乏力筋脈拘急四肢疼

痛不得睡卧宜服

酸棗仁

一兩
微炒

麥門冬

去心

防風

去蘆頭

芍藥

各半兩

當歸

微炒

白茯苓

羚羊角屑

人參

去蘆頭

黃耆

劉各三兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎六分去滓不計時候溫服

麥門冬散

出聖忠方

治傷寒後胃氣虛乏不思飲食四肢少

力心神煩悶不得睡卧

麥門冬

去心

黃耆

剉

人參

去蘆頭

白朮

各三分

白茯苓

各一

兩

酸棗仁

甘草

炙微赤剉

芍藥

桂心

半夏

湯洗七遍

去滑各

半兩

陳橘皮

三分湯浸

去白穰焙

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分竹

葉七片棗三枚煎六分去滓不計時候溫服

茵陳散

出聖惠方

治傷寒後伏熱在心中恍惚多驚不得睡

卧宜服

茵陳

犀角屑

赤芍藥

麥門冬

黃芩

梔

子仁

甘草

各半兩炙微赤剉

柴胡

去苗 茯苓 各一兩

右搗篩為末每服四錢以水一中盞入生薑半分竹

葉二七片生地黃一分煎至六分去滓不計時候

溫服

梔子豉湯

出德生堂方

治傷寒汗後虛煩不得眠卧劇者必

反覆顛倒心中懊懣感冒發為寒熱頭疼體痛並皆治之

梔子

十四枚

香豉

四合

右咬咀麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服一二服得吐止後服一方有薤白一握一方黑砂糖一小塊嚼下用服以漿水投之即吐

酸棗仁湯

出活人書

治傷寒吐下後心煩氣乏晝夜不得眠

酸棗仁

炒一兩

麥門冬

去心焙二合

甘草

一分炙

知母

切焙半兩

白茯苓

去黑皮

芎藭

乾薑

各一兩

右咬咀如麻豆大每服四錢水一盞半煎至一盞溫

服

酸棗仁甘草湯

出聖濟總錄

治傷寒後勞損煩躁不得眠

酸棗仁

微炒四兩

甘草

炙剉

當歸

切焙

桂

去粗皮

人參

白茯

苓

去黑皮

石膏

碎

芎藭

各三兩

遠志

去心一分

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

不拘時

酸棗仁湯

出聖濟
總錄

治傷寒汗後不得眠睡

酸棗仁

微炒
二兩

人參

一兩

石膏

碎

桂

去粗
皮

知母

切
焙

甘草

炙各
半兩

赤茯苓

去黑皮
三分

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

不拘時

酸棗仁黃芩湯

出聖濟
總錄

治傷寒餘熱未散不得眠睡

酸棗仁

微炮
二兩

黃芩

去黑
心

麥門冬

去心
焙

甘草

炙各
半兩

遠

志

去
心

草薢

各一
兩

人參

切

茯神

去木
各一兩

桂

去粗皮
三分

右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞

去滓食前溫服日再

梔子仁湯

出聖濟
總錄

治傷寒後虛煩不得眠睡吐逆

梔子仁

豉

炒各
一兩

酸棗仁

炒
一兩

芎藭

陳橘皮

去
白

焙

人參

去蘆
頭

白茯苓

去黑皮
各半兩

右粗搗篩每服三錢水一大盞生薑三片煎至七分

去滓食前溫服日再

人參湯

出聖濟
總錄

治傷寒後虛勞不得眠煩悶四肢乏力

方見傷寒

門虛類

柴胡湯

出聖濟總錄

治傷寒後虛煩熱驚悸不得眠睡

方見傷寒

門虛

煩類

麥門冬茯苓飲

出聖濟總錄

治傷寒後煩滿心神恍惚不得

眠睡

方見傷寒門虛煩類

地骨皮飲

出聖濟總錄

治傷寒後虛煩客熱累夜不得眠頭

疼眼疼迷悶

地骨皮

洗

麥門冬

去心各二兩

酸棗仁

炒三兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑五片煎至七

分去滓食後溫服

梅實丸

出聖濟
總錄

治傷寒後虛煩不得睡

梅實肉

大棗肉

酸棗仁

炒等分

右同搗成膏丸如彈子大每服一九卧含化服

酸棗仁湯

出聖濟
總錄

治大病後及虛勞不得眠

酸棗仁

炒

榆皮

切各
三兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

黃連阿膠湯

出肘後方

治傷寒少陰病得之二三日以上者

心中煩不得卧

黃連

一兩

阿膠

三分

鷄子黃

半箇

黃芩

一分

芍藥

半兩

右剉散每服四錢水二盞煎取一盞去滓內膠消盡

鷄子黃攪令和溫服日二服

半夏茯苓湯

出肘後方

治差後煩虛不得眠眼中疼痛懊懷

半夏

三兩

秫米

一升

茯苓

四兩

右切以千里流水一石揚之萬遍澄取二斗合煮諸

藥得五升去滓溫分五服忌羊肉餛醋等物

治差後虛煩不得眠眼中痛疼懊懷

出肘後方

豉

七

烏梅

十七枚

右以水四升先煮烏梅一升半內豉取一升半分再服

無烏梅用梔子十四枚亦得

溫膽湯

出易簡方

治大病後虛煩不得睡兼治心膽虛怯觸

事易驚或夢寐不祥或異象眩惑遂致心驚膽懾氣
鬱生涎與氣傳變生諸症或氣短悸乏或復自汗或

四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安悉能治之

半夏

枳實

各一兩

橘紅

一兩

甘草

四錢

茯苓

三分

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚竹茹

一塊如錢大煎至六分去滓食前熱服竹茹即刮

竹青也此藥大治傷寒後及一切病後虛煩夜睡

不寧者並宜用之 若傷寒後尚有餘熱并熱在

上焦又無汗下後表裏俱虛不可攻者宜用竹

葉石膏湯不利發熱竹葉湯中去石膏如熱附子

名既濟湯嘔者二陳湯 一法治傷寒重症時或
發消渴燥煩用新羅參不拘多少煎湯浸令水冷
後盛渴之時與之頓服熱則隨去 大抵傷寒渴
者不可多與之水水積胸中便為結胸然亦須濡
瀉之可也結胸治法見于理中湯方中 傷寒後
咳逆其症最為危當用半夏一兩生薑一兩半白
水煎服其他病亦惡咳逆當用丁香十粒乾柿蒂
十五枚煎湯半盞乘熱頓服

傷寒虛汗不止論

夫傷寒自汗者謂不因發散而自然汗出者是也內經曰陽氣衛外而為固也衛為陽言衛護皮膚肥實腠理禁固津液不得妄泄汗者干之而邪出氣干于衛氣氣不能衛故于外則皮膚為之緩腠理為之疎由是而津液妄泄濺濺然閉漿漿然出謂之自汗也如發熱自汗出而不愈此衛氣不和風邪干于衛也太陽中暍汗出惡寒身熱而渴者暑邪干于衛者也是知衛氣固護津液不令妄泄心為邪氣干之而出

也風寒暑濕之毒為四脈之氣中人則為傷寒風與暑濕為邪皆冷自汗惟寒邪傷人獨不出寒傷榮而不傷衛無邪氣所干則皮腠得以密津液得以固是以不出也及其寒漸入裏因而為熱則亦使自汗出也蓋熱則榮衛通腠理開而汗泄矣然自汗之症又有表裏之別焉虛實之異焉若汗出惡風微惡寒者此表未解也必待發散而後愈至於漏不止而惡風及發汗發惡寒者又皆表之虛也必待溫經而後愈諸如此者皆邪氣在表者也汗出不惡寒者此為表解而

裏未和也經曰陽明發熱汗出此為熱越又曰陽明病發熱汗多者急下之又非若邪氣在表而汗出之可緩也傷寒自汗之證為常也設或汗出髮閉又或出之如油或大如貫珠著身出而不流皆為不治之證也必手足俱周遍身悉皆潤澤一時間許煩熱已而身涼和乃為佳矣此則陰陽氣和水升火降榮衛通流邪出而解之也內經曰陽之汗以天地之雨名之此之謂也歌云汗多要自傷風始風濕風溫胃不和中暑亡陽并霍

亂陽明柔痙亦同科 又論云傷風桂枝湯渴者五苓散不渴者茯苓甘草湯自汗出而小便難者桂枝附子湯自汗出而小便數者不可用桂枝也芍藥甘草湯風濕風溫各有本條衛不和病人臟無他病時發熱自汗是也桂枝湯亡陽丸發汗多而漏不止者曰漏風亡陽桂枝附子湯尺寸脈俱緊主無汗而反汗出曰亡陽屬少陽法當咽痛猪膚湯甘桔湯四肢冷而厥逆惡汗者四逆湯大抵陰病四肢逆冷額上及手背冷者發當無汗

而有汗者曰亡陽四逆湯煩燥惡風汗出防風白朮牡
蠣湯次服小建中湯汗多不止者溫粉投之霍亂手足
逆冷者四逆湯有熱症而霍亂及中暑者香薷散信効
多用小柴胡湯依常法前後極冷服之効陽明汗多而
渴者調胃承氣湯陽明法當多汗者不可不知也小便
自利者不可用承氣湯攻之宜服蜜導法惡寒者表未
解桂枝湯反無汗惡寒者升麻葛根湯反無汗而喘者
麻黃湯 陽明症自汗出應小便不利而反利者津液

內竭也尿雖硬不可攻之宜蜜導法猪膽導法

方

石膏散

出聖惠方

治傷寒頭痛惡寒虛汗不止宜服

石膏

牡蠣

各三分
燒為粉

地骨皮

白朮

五味子

黃耆

剉

麻黃根

各半兩

右搗篩為散每服五錢以水一中盞煎六分去滓不

計時候溫服

白朮散

出聖惠方

治傷寒體虛汗出心煩頭痛惡風宜服

白朮

麻黃

不去根節

石膏

芎藭

三分

甘草

炙微赤剉

羌活

羚羊角屑

桂心

知母

各一兩

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎五分去滓不計時候溫服

治傷寒汗出不歇宜服此方

出聖惠方

川大黃

剉碎微炒

黃連

去積

梔子仁

黃蘗

塗蜜微炒剉

麻黃

根

去土各一兩

右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

治傷寒體虛夜卧汗出不止時發頭旋惡心不食宜服

此方

人參

去蘆頭

半夏

湯洗七遍去滑

黃耆

剉各一兩

麻黃根

半兩

牡

蠣

二兩燒為粉

防風

三分去蘆

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎

五分去滓不計時候溫服

麻黃根湯

出聖惠方

治傷寒虛汗不止

麻黃根

黃耆

劉

龍骨

各一兩

五味子

半兩

牡蠣

二兩燒為

甘草

粉三分炙微赤

右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

白茯苓散

出聖惠方

治傷寒脈微細汗出不止漸覺虛羸宜

服

白茯苓

人參

去蘆頭

麻黃根

牡蠣

燒為粉

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去皺皮炙乾各一兩

白朮

白芍藥

各三分

五味子

半兩

右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓
不計時候溫服

人參散

出聖惠方

治傷寒虛汗不止多煩躁時時驚悸宜服

人參

去蘆頭

遠志

去心

白茯苓

麥門冬

去心

黃耆

剉

柴

胡

去苗各半兩

甘草

一分炙微赤剉

龍骨

一兩

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗

三枚煎至五分去滓不計時候溫服入竹茹一分

同煎

牡蠣散

出聖濟
總錄

治傷寒脈候軟弱神氣羸劣虛汗不止

宜服

牡蠣

一兩燒
為粉

白茯苓

人參

去蘆
頭

白朮

白芍藥

麻黃根

各三
分

右搗為散每服不計時候以粥飲調二錢

治傷寒體虛汗出不止時時心悸宜服此方

出聖
惠方

茯苓

伏龍肝

各一
兩

牡蠣

一兩半
燒為粉

麻黃根

二
兩

右搗細羅為散每服不計時候煎金銀湯調二錢

治傷寒汗出不止漸至困羸宜用此方

出聖惠方

牡蠣

燒為粉

麻黃根

各五兩

滑石

三兩

丁香

一兩

甘松香

二兩

右搗羅為散每度用生絹包藥五兩揆身體以汗止為度

治傷寒濕溫汗出偏身如水虛汗不止宜服

出聖惠方

杜仲

一兩半去粗皮炙微黃剉

牡蠣

二兩燒為粉

右搗羅為散每服不計時候以溫水調下二錢一方等分搗篩向暮卧以水服一錢午後汗止者不再

服服之令人乾燥若汗不止者復服一錢不過再服必有驗天行及百病後虛吸漏汗遂溫之無不

止者

牡蠣散

出聖惠方

治傷寒汗不解宜服

牡蠣

燒烏粉

熟乾地黄

白朮

龍骨

人參

去蘆頭各

一兩甘草

炙微赤剉

白芍藥

麥門冬

去心各半兩

黃耆

剉二兩

右搥篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎六分去滓不計時候溫服

又方

出聖惠方

麻黃根

牡蠣粉

黃耆

剉

人參

去蘆頭

地骨皮

龍骨

各一兩

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入棗三枚煎至

五分去滓不計時候溫服

又方

出聖惠方

牡蠣粉

麻黃根

杜仲

去粗皮炙微黃剉

黃耆

剉各一兩

右搗細羅為散不計時候煎蛤粉調二錢

又方

出聖惠方

麻黃根

一兩半

故蒲扇

燒灰半兩

右搥細羅為散每服不計時候以牛乳汁調下二錢

治大病差後多虛汗及眼中流汗方

出肘後方

甘草

石斛

各一兩

右搥末以漿水服方寸七日二服差

治大病後虛汗出不禁

粳粉

豉

各等分炒焦

故竹扇

如掌大燒灰

右合搗以絹囊盛粉身立止

治汗不止方

出千金方

右用地黃三斤切以水一斗煮取三升分三服

又方

出千金方

右以白朮葉作飲飲之一方白朮方寸七日以飲服之

治卒得汗不止方

出千金方

右以溫酒服牛羊脂一方服尿亦止

溫肺湯

出指南方

治感寒多汗

五味子

細辛

去苗

半夏

湯洗七次

甘草

乾薑

各一兩

右為粗末每服五錢水二盞棗一枚擘破同煎一盞

去滓服

甘草附子湯

出指南方

甘草

一兩

附子

去皮臍

桂

四兩去皮

右為粗末每服五錢水二盞煎一盞去滓服

治吹霎冒雨頭痛惡寒虛汗出不止脈氣沈細頭冷痛

嘔逆惡心

出護
命方

麻黃

去根

芍

藿香

白朮

黃橘皮

各一分

甘草

細辛

各二
銖

右細羅為末每服二錢水一盞煎取八分食後空心

去滓服

傷寒毒攻手足

論

夫傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣客于腑臟邪結在裏循經而出注於四肢故令人手足煩熱赤腫

疼痛也 病源熱毒氣從臟腑中出攻于手足則手足
焮熱赤腫疼痛也人五臟六腑并榮衛皆出于手足指
故此毒從內而出攻于手足也

方

連翹散

出聖
惠方

連翹

當歸

麥門冬

去心

黃芩

犀角屑

各一兩

川

大黃

剉碎
微炒

木香

防風

去蘆
頭

羌活

枳殼

麩炒微
黃去穢

牛蒡子

微炒
半兩

麝香

一錢
細研

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候溫服

治傷寒毒氣攻四肢虛腫宜服此方

出聖惠方

澤瀉

柴胡

去苗

甜葶藶

隔紙炒令紫色各三分

半夏

湯洗七遍去滑

甘草

炙微赤剉各半兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

細辛散

出聖惠方

治傷寒發渴寒熱唇口乾焦毒氣攻四肢

皆浮腫

細辛

芎藭

郁李仁

各一兩湯浸
去皮尖微炒

赤茯苓

麥

門冬

去心各
一兩半

桑根白皮

二兩

甘草

三分炙
微赤剉

右搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

治傷寒毒氣攻手足虛腫宜貼膏方

一名鉛丹膏
出聖惠方

黃丹

半兩
蠟三兩

松脂

麻油

各一兩

乳香

麝香

各一兩

右各別研為末以瓷器內先煉松脂并油次下蠟及

黃丹乳香等慢火煎少時候冷攤于絹上貼腫處

一切腫毒并用之

一方無麻油

又方

出聖惠方

清油

一合蠟半

兩鹽花

一合

右以瓷器中煉油熟次下蠟并鹽花用文武火煎成

膏貼於腫處

治傷寒毒氣攻手足虛腫疼痛宜服此方

出千金方

右用赤馬通一升水一斗五升煮取一斗絞取汁

冷熱以漬手足

又方

出千金方

羊糞末

一兩

煉成猪脂

二兩

右相和令勻用塗腫處

又方

出千金方

治時氣傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方

右用虎杖半斤細剉以水一斗五升煎至一斗去滓

看冷熱以漬手足一方令踝上有水尺許止之

又方

出聖惠方

右用苦參半斤以水一斗煎至五七沸去滓看冷熱
漬手足至踝上一尺止

豉酒方 治傷寒毒氣攻手足及身體虛腫宜服此方

出聖
患方

右用豉五合微炒以酒一升半煎五七沸去滓隨性
稍熱飲之

治傷寒毒氣攻手足腫方

出聖
患方

猪蹄

一
葱白
連鬚
十莖

右以水五升煮令猪蹄熟去滓入鹽二錢看冷熱漬腫處

治傷寒毒氣攻手足虛腫及疼痛欲脫方

出聖
患方

豕一

斤猪肉一

右以水一斗煮令猪肉熟去滓看冷熱用漬手足

治傷寒時氣瘟疫病毒氣攻手足虛腫及疼痛欲脫亦治

毒攻陰腫

出聖
患方

右用黃蘗二斤細剉以水一斗五升煎至五七沸去

淳者冷熱漬手足

又方

出聖惠方

猪肉

一斤

桃葉

一斤

右以水一斗五升煮令肉熟去滓者冷熱漬手足

又方

出聖惠方

右用蒼耳苗絞取汁以漬手足

又方

出千金方

右以稻稬燒灰淋汁漬之

治傷寒毒攻手足痛

右煮羊桃汁漬之佳少加鹽豉尤好

療傷寒手足疼欲脫

出千金方

右取羊屎煮汁以灌之一方漬之差止疼療時疫陰

囊及莖熱腫亦可煮黃蘗等洗之並除傷寒之疾

防已丸

出聖濟總錄

治傷寒後毒氣攻四肢虛腫及喘息促

急

防已 葶藶子

炒

郁李仁

炒

赤茯苓

去黑皮

百合

各半

兩桑根白皮

別木通

別各澤漆

炒一

右搗羅為末煉蜜和更搗三五百杵九如梧桐子大
每服二十九空心煎桑白皮湯下

五香湯

出聖濟
總錄

治傷寒毒氣攻四肢兩胸背虛腫

沈香

木香

薰陸香

鷄舌香

別研各

麝香

研

錢白薇

分三

枳實

炒

麻黃

去根

防風

去

姜蕤

秦朮

去苗

獨活

去蘆

甘草

炙各
半兩

右除五香別搗外粗搗篩每服三錢用水一盞煎至

七分去滓下五香末一錢再煎令沸溫服食前臨
卧日三服

治傷寒餘熱不退論

夫傷寒病其人已經發汗吐下或服藥已後而脈洪大
實數腹內脹滿小便赤黃大便難或煩或渴面色變赤
此為藏有結熱故也傷寒後餘熱不解者蓋陰陽未和
邪氣未盡搏留經絡蘊而生熱潮作如瘧鼻衄煩躁面
赤目黃腹滿小便不利大便乾澀或即譫言渴欲水飲

脈沈數者當以裏症求之脈若但浮者當消息治其外

又云下之而熱不退者蓋病人脈微而濡為醫所病大發其汗使陽氣微細天下之後陰氣弱其人工亡血病常惡寒後乃發熱無休止時蓋陽微則惡寒陰弱則發熱陽微惡寒四逆湯主之陰弱發熱為內熱葶藶苦酒湯主之大抵傷寒八日已上大發熱者此為難治仲景云脈陰陽俱虛熱不止者死又有醫人多用九針藥下之身熱下住微煩者梔子蘗湯主之傷寒五六日大下之後不去心中結痛者未欲解也梔子湯主之

方

犀角散 治傷寒餘熱不退心神煩躁

犀角屑

木通

三
分
判各

黃芩

土瓜根

龍膽

去
頭各

一
兩
川朴
半
兩

右粗搗篩每服四錢以水一中盞去滓不計時候溫

服

柴胡散

出聖
惠方

治傷寒餘熱不退發渴煩燥胸膈氣滯不

思飲食

柴胡

去
苗

川大黃

判
微炒

枳殼

麩炒
微炙去穢

龜甲

去裙襴
醋炙令黃

檳榔

人參

去蘆
頭

木香

子芩

赤芍藥

赤茯苓

苓

紫苑

去苗已上
各三分

犀角屑

甘草

炙微赤判
各半兩

桑

根白皮

一兩
判

右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

葳蕤散

出聖
惠方

治傷寒十日已上餘熱不解時發增寒

葳蕤

柴胡

去苗

桑根白皮

判各
一兩

羚羊角屑

川朴

硝

各三
分

甘草

半兩炙
微赤判

石膏

二兩

厚朴

三分去粗皮塗
生薑汁炙香熟

肉桂

半兩去
粗皮

右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分

去滓不計時候溫服

知母散

出聖惠方

治傷寒已汗下後餘熱未退頭痛口乾煩

燥

知母

蓀蓀根

麥門冬

去心各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

石

膏

一兩

右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分粳米五

十粒竹葉二七片煎六分去滓不拘時溫服

梔子湯

出聖惠方

治傷寒五六日大下之後餘熱不去心中

結痛

方見木門傷寒後不得眠類
梔子豉湯但加生薑半分煎

人參散

出聖
惠方

治傷寒發汗大下之後餘熱不去心中多

煩

人參

一兩去
蘆頭

陳橘皮

湯浸去
白穰焙

麥門冬

去
心

梔子仁

茯苓

神

各半
兩

右粗搗篩每服四錢水一中盞煎六分去滓不計時

候溫服

茵陳散

出聖
惠方

治傷寒後餘熱在心恍惚多驚不得眠睡

茵陳 梔子仁 赤芍藥 生乾地黃 各三分 犀角

屑

半兩

麥門冬

去心

茯神

各一兩

甘草

一分炙

微赤剉

右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分青竹葉

二七片煎六分去滓不計時候溫服

黃芩九

出聖惠方

治傷寒後餘熱不退口乾煩燥

黃芩

梔子仁

川大黃

剉碎

鐵粉

已上各二兩

甘草

半兩炙

微赤剉

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候溫水下

二十九

龍膽丸

出聖惠方

治傷寒後餘熱在於胸中煩渴悶亂

龍膽

去蘆頭

青葙子

各一兩

黃芩

梔子仁

苦參

各別

半兩

菰蘆根

半兩升麻

黃蘗

劉各三分

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大不計時

候溫水下三十丸

麻黃湯

出聖濟總錄

治傷寒後餘熱脈浮者

麻黃

去根節煎掠去沫焙

芍藥

甘草

炙令微赤劉各一兩

桂

去粗皮

細

辛

去苗葉
各半兩

右粗搗篩每服五錢以水一盞半煎取八分去滓溫服日三

葛根湯

出聖濟
總錄

治傷寒及天行後頭痛餘熱不解

葛根

剉

柴胡

去苗各
一兩

芍藥

黃芩

去黑
心

甘草

炙
剉

去粗皮
各半兩

麻黃

去根節掠去
沫焙三分

右粗搗篩每服五錢水一盞半棗二枚劈煎至六分

去滓不計時候溫服

葛根湯

出聖濟
總錄

治傷寒後餘熱不除及寒熱頭重體痛

表症尚未罷

葛根

芍藥

白茯苓

去黑皮

黃芩

去黑心

烏頭

炮製去皮

臍

芎藭

各一兩

梔子仁

半兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入豉三七粒煎至七分去滓溫服

茯苓湯

出聖濟總錄

治傷寒後餘熱不退心神煩躁

赤茯苓

去黑皮一兩半

人參

一分

甘草

炙剉半兩

右粗搗篩每服三錢用水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

茯苓湯

出聖濟
總錄

治傷寒餘熱不除及四肢拘急痛胸膈

不利嘔逆不思飲食

赤茯苓

去黑皮

柴胡

去苗

枳殼

去穰
麩炒

桑根白皮

剉各
半兩

麥

門冬

去心焙
半兩

葛根

剉三分

甘草

剉半
兩炙

肉桂

去粗皮

人參

各一
兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片大棗二枚劈

煎至七分去滓溫服

葛根人參湯

出聖濟
總錄

治傷寒發汗及吐下後餘熱不退

頭痛滿悶口乾

葛根

對一兩

人參

一兩

麥門冬

去心焙半兩

黃芩

去黑心半兩

黃

耆

對一兩

地骨皮

石膏

碎各半兩

右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫

服

姜薤湯

出聖濟總錄

治傷寒數日餘熱不解時發寒熱

姜薤

柴胡

大苗

羚羊角

銹各半兩

石膏

碎半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓不計

時候溫服

人參湯

出聖濟總錄

治傷寒後餘熱不退

人參

一兩

知母

一分

甘草

炙別

黃芩

去黑心

石膏

碎各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入竹葉粳米各少許同

煎至七分去滓不計時候溫服

柴胡湯

出聖濟總錄

治傷寒後餘毒不解頰赤口乾四肢煩

熱

柴胡

去苗

茵陳蒿

甘草

炙別

人參

各一兩

大黃

剉炒半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞小麥五十粒同煎七分

去滓溫服不拘時候

逐魂丹

出衛生家寶方

治傷寒後餘熱在心譫言妄語甚者顛

狂如失心狀但是一切心疾服之無不尅效

新羅人參

一兩半

硃砂

半兩湯浸去皮取仁焙乾淨秤

右先將人參為末別研硃砂極細和之酸棗仁焙急

研入藥勿羅豬心血圓如桐子大參湯下二

十圓日三服後畧卧少時

玄參散

出王氏
博濟方

治汗後餘熱未解

川大黃

玄參

朴硝

白藥子

各半
兩

甘草

二分

右件五味同為末每服一錢水一盞煎至八分放冷

服再服差

退黃散

出王氏
博濟方

治汗後餘毒未解皮膚黃色

石膏

牙硝

川大黃

山梔子

紅雪

甘草

各等

分

右件六味同為末每服一錢水一盞入寒石末少許

同煎至八分溫服立效

普濟方卷一百四十

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十一 明 周王朱橚 撰

傷寒門

傷寒兩感

論

夫兩感傷寒者一日巨陽與少陰俱病頭痛口乾煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲飲食譫言也

音占多言也

言妄語三日少陰與厥陰俱病則耳聾囊縮厥

逆水漿不入不知人事即難治也何者臟腑表裏同受

其邪五臟內傷六腑閉塞陰陽交爭榮衛不行如是之後三日乃死夫傷寒兩感初得一二日不得汗又吐下不得其人四肢沈重心神昏悶手足厥逆心中煩躁渴欲飲水頭疼增寒壯熱或即吐逆腹脇疼痛轉加困重不得睡卧陰陽交併不可救療如此症候當觀其形症善惡察其受病淺深而行拯療亦可差也歌曰兩感膀胱對少陰頭疼口燥大而沈胃脾肝膽二三日脈症雙傳准例尋又論三傷寒惟兩感不治兩感者半屬於陰

半屬於陽臟腑俱受病也一日太陽少陰俱病則頭疼
口乾燥煩滿而渴脈大而沈二日陽明太陰俱病則身
熱鼻乾譫語腹滿不食脈長而沈三日少陽厥陰俱病
則耳聾囊縮厥冷水漿不入脈弦而沈或三日而彊或
六日而仆張氏無治法但曰兩感病俱作治有先後發
表攻裏本自不同雙鍾以意斟酌謂如下利不止身體
疼痛急先救其裏與四逆湯如不下利但身體疼痛急
先救其表與桂枝湯此為治有先後其達權識變之論

也謝復古釋張氏治先後之說亦以為陽先受病在乎表則先解表陰先受病在乎裏則先救裏是亦一意然先表者裏不可緩先裏者表亦不可緩也與

方

人參散

出聖惠方

治兩感傷寒一兩日不得汗脈沉遲心中

煩悶毒氣相傳陰陽交併

人參

去蘆頭

川大黃

剉碎微炒各一兩

附子

炮製去皮臍

乾薑

炮製

判

訶梨勒皮

各三分

檳榔

半兩

右為粗散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱服良久喫熱粥投之以助

藥力

桂心散

出聖惠方

治兩感傷寒頭疼身熱心胸悶亂宜服發

表

桂心 前胡

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

皂莢灰

厚朴

去粗皮塗

生薑汁炙令

香熟各一兩

右為細散每服不計時候生薑湯調下二錢頻服汗

出為度

解表散

出聖惠方

治兩感傷寒毒氣傳受陰陽交併

附子

炮製去皮臍

麻黃

去根節各一兩

乾薑

半兩炮製

薄荷

一分

右為麤散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候熱服衣蓋汗出

四逆湯

出十便良方

治兩感傷寒陰陽二毒交併身體手足

厥逆心中熱悶強語三部脈微細宜急救之

乾薑

三分炮製

附子

炮製去皮臍

桂心

各一兩

甘草

半兩炙微赤判

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候熟服良久喫熱粥以助藥力汗出為度

附子散

出聖惠方

治兩感傷寒徧身疼痛腦目疼悶心胸煩

熱四肢沈重

附子

一兩炮製去皮臍

桔梗

去蘆頭

防風

去蘆頭

桂心

羌活

乾薑

炮製

黃耆

剉

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟各一兩

甘草

半兩

炙微

赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候熱服良久喫熱粥投之衣蓋取汗

治兩感傷寒不得汗頭疼心胸不利

出聖惠方

人參

去蘆頭

赤茯苓

芎藭

枳殼

麩炒微黃去穢

厚朴

去阻

度塗生薑汁

炙香熟用

桂心

各半兩

訶梨勒皮

吳茱萸

一分湯

浸七遍焙

乾微炒

右為細散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二

枚煎至五分去薑棗不計時候和滓稍熱服良久喫

熱粥投之衣蓋取汗

麻黃散

出聖惠方

治兩感傷寒內實氣逆不順皮肉乾燥

麻黃

去根節

川大黃

剉碎微炒

訶梨勒皮

桂心

羌活

赤芍藥

桔梗

去蘆頭各半兩

甘草

三分炙微赤剉

麥蘖

一兩炒令微黃

右為細散每服二錢以水一小盞煎至五分不計時

候和滓溫服

治兩感傷寒三兩日不得汗悶亂目張四肢逆冷心腹

堅硬大便不通方

出聖惠方

牽牛子

二兩生搗取末一兩

川大黃

半兩剉製微炒

乾薑

炮製剉

蓬莖

桂心

各一兩

右為細散入牽牛子末同研令勻每服用水一中盞
入生薑半分葱白三莖豉四十九粒煎至六分去
滓調下二錢取利為度

治兩感傷寒沈重救急有效宜預合此方

出聖惠方

硫黃

細研水飛過

硝石

細研如粉各五兩

皂莢

十挺下枲者去黑皮塗酥炙令

黃焦

去子

右先將皂莢槌碎用十二月雪水一升浸兩日熟按

以生絹濾取汁和前件硫黃硝石硬軟得所入甕
瓶內盛封瓶口不得通風背陰處掘地二尺深埋
瓶從正月一日至十五日取出太濕即更陰乾三
兩日即以新炊飯爛研相和丸如菉豆大每服不
計時候以葱茶下五丸如是食毒即先轉瀉後服
之

治兩感傷寒四肢厥冷急宜服此方

出聖惠方

附子

半兩燒半黑

芫花

半兩醋拌炒令黃黑色

皂莢

半兩去黑皮塗酥炙黃焦

去
子

右為末同豉心一合湯浸細研如膏入藥末和丸如
梧桐子大每服不計時候用去根節麻黃湯下十
九如人行五里一服以汗出為度

三聖散

出聖
惠方

治兩感傷寒昏沈迷悶燥渴頭疼漸加沈
重

天靈蓋

一枚白色者
塗酥炙令黃

苦參

三兩

甘草

一兩判
炙微赤

右為細末每服不計時候以熱酒調下一錢

葱朮散

出傳信
通用方

治不別陰陽二症染患淺深凡時氣行

瘟疫及尋常風吹雨霎頭目昏重四肢熱倦行步少
力骨節疼痛悉皆治之

蒼朮

洗淨
一斤

葱

連根鬚洗
淨一斤

麻黃

不去節
四兩

甘草

二兩
炙

右將葱朮入臼中杵令葱涎相入盆中堅捺令熟冬
間半月春夏五七日取出鍋中炒葱葉過焦遂旋
篩出以朮乾為度次入麻黃甘草為末每服二錢
水一盞薑三片棗二枚煎七分去滓熟服如要出

汗連進二三服以衣蓋之常服解諸勞倦行路緩急取為先務

芎藭飲子

出德生堂

治四時傷寒不問兩感頭疼發熱增寒

咳嗽七日內外皆可服病在上則吐在表則汗下則泄其病即解並皆治之

川芎

猪苓

去黑皮

蒙本

淨

柴胡

去蘆

芎藭

乾葛

甘草

桑白皮

各半兩

右咬咀如法修製每服五錢水盪半生薑三片同煎

八分去滓溫服滓再煎如要出汗者加連鬚葱白

一根同煎

一方無

生薑

二和散

出經効
濟世方

治調適陰陽和養榮衛心胸痞悶飲食不

進凡傷寒陰陽不分服之氣正

藿香葉

香附子

去
皮

右等分為粗末每一錢水二盞煎至六分去滓溫服

不計時候

又方

出肘
後方

右用虎杖治大熱煩躁止渴利小便壓一切毒暑月
和甘草煎色如琥珀可愛嘗之甘美入瓶內置井
中令冷徹入白瓷器及銀器中收貯似茶啜之時
人呼為冷飲子又且美於茗能破女子經後不通
擣以酒浸常服有孕人勿服破血

烏朮散

楊氏家藏方

治感冒風寒濕氣不問陰陽二症皆可

服之

烏藥

川芎

杜白芷

各十兩

青皮

四兩半

蒼朮

七兩

甘

草一兩半

紫蘇

香附子

各十兩

陳皮

五兩

右為細末白湯點無時服

主傷寒傳諸藏表裏名為兩感方

余居士選奇方

木猪苓

乾地黄

地骨皮

茯苓

麥門冬

人參

各二兩

小麥

一升

桑白皮

二兩

右六味剉作六貼每貼以水三升葱頭七個小麥桑

白皮煎減半內一貼煎減一升分二貼口苦面腫

夜睡狂語並宜服之

又方

余居士
選奇方

人參

茯苓

茱萸

木猪苓

桂心

蕪荑

分六八

白朮

分四

茵陳

分十

甘草

分四

右為末煉蜜丸如彈子大熟水研一九無時服

來麤散

廣南衛
生方

治四時傷寒不問陰陽二症表裏不分

並宜服之

香附子

一斤

陳橘皮

半斤不
去白

紫蘇葉

一斤
去梗

蒼朮

一斤

炒

甘草

五兩
炙

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候日可二服

荳蔻散

出王氏
博濟方

治兩感傷寒結胸壯熱惡寒飲食不下

大小腸閉塞陰毒昏沈下水結撮痛四肢逆冷心煩
不省人事食後結聚心下逆滿坐卧不得宜服此

肉荳蔻

二枚

麻黃

去根
一分

木香

一分

吳白朮

一分

吳茱萸

一錢

附子

八錢炮
去皮

乾薑

二錢炮

桂心

三錢

蚺蛇

五個碧朱炒
令黃去其味

訶梨勒

二枚炮

檳榔

二枚

當歸

一分

青橘皮

二七片

茯苓

去皮

八

白朮

川烏

生去
皮臍

良薑

剉

麻黃

不去
節

天麻

生
苗

吳

茺蔚

生
用

葛根

乳香

另
研

川椒

去子并
閉口者

全蝎

生
用

當歸

各一兩
去苗

川薑

生用
半兩

右為粗末入乳香勻炒十錢痛甚者加至十五錢同
細鹽一處炒如極熟用熟絹袋內貯藥熨烙痛處
不拘早晚頻用為效如藥冷即再炒一次用畢其
炒藥不用

薏苡仁散

治濕傷腎不養肝肝自生風遂成風濕流

注四肢筋骨或入左肩髃肌肉疼痛漸入左指中

薏苡仁

一兩

當歸

酒浸

人參

川烏

炮

川芎

白朮

羌活

桂心

防風

去蘆

茵芋

炒

麻黃

去根節

乾薑

炮

獨活

甘草

炙各半兩

右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服

徐神翁神效地仙丹

治筋骨疼痛打撲傷損仙木湯

送下除寒濕進飲食神效

川烏

一個去尖

草烏

五個去火

荊芥

去枝半兩

蒼朮

一兩米泔浸一宿

炒

白

芷

半兩

自然銅

研一字

地龍

沒藥

各半兩研

乳香

半錢研

蒿

菖種

黃瓜種

稍瓜種

木鼈子

各一錢

半兩錢

文二

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服十九食後酒送

下

虎骨丸

治經絡凝澁骨節疼痛筋脈攣急遇陰寒愈

痛

南乳香

研別

沒藥

研另

赤芍藥

熟地黃

虎脰骨

炙醋

黃
當歸

各一兩

血竭

五錢

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香在內以麻縷
定勿令透氣好酒二升煮至酒盡取木瓜去皮研
如泥更入熟蜜少許杵和為丸如梧桐子大每服
三十九病在上食後在下食前溫酒下

治骨節疼痛煩不得屈伸近之則痛短氣得汗出或欲
腫者

附子

二兩

桂心

四兩

白朮

三兩

甘草

二兩

右用水六升煮取三升分三服汗出愈

治卒得胸痛瘥而復發者

右取薤根五斤搗絞汁飲之立止

加減當歸飲子 治肩忽疼

防風 當歸 柴胡 生地黄 大黃 各一兩半 芍藥

人參 黃芩 各一兩 甘草 二錢 黃連 五錢 滑石 六兩

右為散以白水煎服無時

活絡湯 治風濕臂痛諸藥不效者此方專主之

白朮

薄切

當歸

淨洗薄切乾秤

羌活

淨洗去蘆切乾

獨活

淨洗

甘草

炙

川芎

各半兩

右剉散每服三大錢水一盞半薑五片慢火煎至一盞去滓溫服並滓不拘時候一方川蒼朮切炒川白芷各二兩為末每服二錢酒調下

起痛丸 治腰臂痛

五靈脂

赤芍藥

各半兩

川烏

一箇

沒藥

四錢

麝香

一錢

右為末酒糊丸空心溫送下

葉氏方十味劉散 治中風血弱臂痛連筋及骨舉動

艱難此藥亦補心益血養筋生力

附子

三兩炮
去皮臍

當歸

去土
洗切

黃耆

炙

白芍藥

各二
兩

茯苓

防風

去
蘖 白朮

各一
兩半

肉桂

去粗皮一
兩不見火

川芎

不見
火

熟地

黃

洗淨用好酒熬令
乾焙之各七錢半

右修製了再秤咬咀每四錢水一大盞薑八片棗三

枚擘開煎七分去滓通口服食後臨睡日三服溫

覆厚衣將養去黃耆熟地黃用當歸去蘆淨洗乾

焙白芍藥川芎白朮人參生附子白茯苓桂心川
獨活防風甘草細判每三錢薑八片水一盞半煎
八分去滓食前服除寒邪益血氣名川獨活湯製地
黃法須洗淨以好酒浸令乾焙之

五靈脂散 治臂脾痛

五靈脂 荊芥穗 防風 羌活 甘草節 獨

活 穿山甲 骨碎補 草烏

各五錢

麝香

少許

右為末用溫酒調下臨卧服如渾身損痛加沒藥木

香酒調下空心服

芎活湯 治水飲停蓄注於絡脈發為臂痛皆因脾土

有虧平日多飲水漿不能傳化所致

川芎

半夏

湯洗

白茯苓

獨活

陳皮

枳殼

去穢

炒各半兩

白朮

甘草

各一分

三物小陷胸湯

治傷寒實結胸無熱症者

桔梗

微炒

貝母

去心各三分

巴豆

去皮心熬黑研如脂一分

右除巴豆外搗羅為散入巴豆各研勻每服強人半

錢羸人減之並溫熟水調服病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利不止進冷粥一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水濯之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

葶藶湯 治傷寒結胸心下痛如石堅硬小便不利

葶藶子

隔紙炒三分

檳榔

剉半兩

桑白皮

炙剉三分

杏仁

湯浸去皮

夾雙仁者炒

大黃

剉醋炒各半兩

朴硝

三分

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食前
溫服

增損理中丸 治傷寒下後虛氣不理毒復上攻毒氣
相搏結於胸中不得下者毒已入胃胃中不通毒還
攻上心中結滿厥逆欲絕心脹胸高不可近當先
理其氣

人參 白朮

甘草

炙

桔萸根

剉

牡蠣

熬

枳實

去殼

炒 赤茯苓

去黑皮一方有黃
苓無赤茯苓一兩

乾薑

炮一兩半

右搗羅為末煉蜜丸如彈子大每服一九熟水化下

不歇再服不過五六丸胸中豁然

一名枳實
理中丸

陷胸青龍湯 治傷寒結胸毒氣內盛手足逆冷腹脹

喘息急大便不通

牽牛子

微炒一兩半

人參

三分

陳橘皮

湯浸去白焙半兩

桂

去粗皮

檳榔

劉各一分

大黃

劉醋炒半兩

朴硝

半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分擘碎同

煎至七分去滓食前溫服

大黃桔梗湯

治傷寒熱病飲水結胸硬滿

大黃

判醋炒
二兩

桔梗

炒一兩

甘草

炙

朴硝

各半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食前

溫服

大金鍼丸

治溫傷寒結胸氣逆手足厥冷嘔逆不定

陽起石

研

不灰木

阿魏

研各半兩

杏仁

二十五枚去
皮尖雙仁者

研巴豆

二十五枚去皮
心膜不出油研

右搗研為細末用軟粟米飯為丸如小彈丸大每服

一九用鍼穿燈焰上燒烟絕為末生薑米飲調服
以利為效

泥金丸 治結胸傷寒心下痛按之實鞭

木香 丁香 大戟 甘遂 臙粉 紫苑

匙炒各一分

三錢

去土 硫黃 檳榔 附子 巴豆

兩皂子大

大者一枚對

炮製去皮臍一枚

三十粒去皮心膜用胡餅 黑牽牛 水銀沙

炒裏慢火燒熟去麪不用

三錢半生半炒

子 三錢

右各搗研為末再和令勻煉蜜為丸如小鷄頭大者

虛實每服一九爛嚼燒生薑一塊子同嚥下藥不
得嚼

大戟散 治傷寒結胸轉下不除者

大戟

炒

甘遂

炒各一兩

膩粉

半兩

硫黃

研一分

水銀

蓋子內與硫黃

同研作沙

子半兩

右搗研為末再同研勻每服二錢溫漿水調下

越桃丸

治傷寒結胸逐利熱毒

越桃

桃花

暴乾各一分

大黃

生剉半兩

白牽牛

取末五兩

鬱金

二錢 丹砂研一錢 巴豆霜研五錢 郁李仁去皮研一兩

右搗研為末滴水丸如小豆大每服一九蜜水下

陷胸散 治傷寒結胸伏陽在裏心下堅硬按之則痛

前胡去蘆頭 甘遂麩炒 甜葶歷隔紙炒 大黃剉微炒 馬牙硝

研各一兩 杏仁湯浸去皮尖并雙仁麩炒一兩

右搗研為末每服一錢生薑蜜水調下更看虛實加

減

宣毒丸 治傷寒結胸心下堅硬

白牽牛

炒

大黃

別各一兩

滑石

朴硝

續隨子

去皮煮研

半兩 郁李仁

去皮炒研半兩

甘遂

炒 大戟

炒一分

右搗為末煉蜜和丸如彈子大看虛實以龍腦蜜水

化下一丸

大通散

治傷寒結胸及瘡疹後毒氣攻心涎嗽喘急

甘遂

麩炒一分

生地黄

一兩與甘遂同搗焙乾

檳榔

別二枚

麥蘗

微炒

半兩 鉛白霜

研一分

右搗研為末看虛實用龍腦漿水調下半錢

金鍼丸

治傷寒陰氣結伏在內胸膈虛痞或痛不可忍

者

不灰木

錢二

陽起石

阿魏

錢各一

白丁香

丹砂

研

乳香

膩粉

錢各一

硫黃

錢二

巴豆

去皮膜出油
二十七粒

右同研勻細糯米粽子和丸如桐子大每服五丸至

七丸丁香湯下不拘時候

膈毒丸

治傷寒結胸心下堅痛

郁李仁

去皮

黑牽牛

炒

大戟

甘遂

各一分

牛黃

研

乳香

研各一錢

麝香

研各半錢

龍腦

研各半錢

右搗研為末同再研勻用白麴糊和丸如梧桐子大
每服七丸煎燈心麥湯下臨卧服

聖餅子 治傷寒結胸

甘遂

大戟

去皮各半兩

黑牽牛

生用一兩半

輕粉

一錢粉霜

一錢水銀

一錢入硫黃一錢結沙

巴豆

去皮醋煮黃十四枚

右先將前三味為末入白麴五錢水和作餅子文武
火煨焦黃再為末後入四味拌勻水和為丸如棗

豆大捏作餅子每服三餅茶湯下

宣風丸

治傷寒結胸熱氣蘊蓄

大黃

末

牽牛子

末

郁李仁

去皮研各半兩

巴豆

一分去皮膜油燂研

右再同研勻煉蜜為丸如小豆大者虛實生薑蜜水

下一丸至二丸

金黃散

治傷寒結胸心下堅滿

黑牽牛

末

大黃

末各一錢

欒金

末

胡黃連

末各半錢

右作一服入膩粉一錢新水調下傷寒後四五日結

胸宜可服或吐或瀉或汗出即愈

桔梗枳殼湯

桔梗

微炒

枳殼

麸炒

甘草

炙

右等分每服五錢水一盞半加生薑三片煎至七分
去滓服或不用生薑亦可痰多加半夏生薑有熱
加黃芩

治傷寒陽症結胸死無可藥者

出經驗良方

右用蚘蟻即蚯蚓十五條乾者搗爛蜜半盞冷水半

碗灌服若無蜜沙糖亦妙

三黃湯

出危氏方

治傷寒陰症下之太早致心下痞按之軟

其脈關上浮者主之若表未解未可攻宜先隨風寒

二症投桂枝麻黃湯表解已即服此方

三因方

大黃

蒸

黃連

黃芩

各等分

右剉為散每服五錢沸湯二盞熟漬之一時夕去滓

分二服暖服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合

同服

尅效交泰聖餅子

出衛生家寶方

治傷寒結胸脈浮不可下下

之必死宜用治之

巴豆

十四粒

黃連

七寸連皮用

右為末用津唾和成膏填入臍下以艾炷其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去為度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡一方加大黃末一錢

治結胸脇秘結方

枳殼

滑石

各二兩

甘草

一兩

右咬咀每服三錢用臭冬橘葉七片同煎溫服連進

三服即解

治傷寒十餘日熱氣結於胸中往來寒熱不定宜服

聖小

惠方

柴胡

去苗

枳實

麩炒微黃

赤芍藥

半夏

湯洗七遍去滑

黃芩

各三

分

甘草

半兩炙微赤剉

桔梗

一兩去蘆頭

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分棗二枚

煎至六分去滓不計時候溫服

半夏湯

出聖惠方

治傷寒三四日不能卧但欲起胸中結熱

煩悶脈洪大者

半夏

三分湯洗上適去滑

黃芩

三分

乾薑

半兩炮製劉

赤茯苓

三分

人

參

三分去蘆頭

甘草

半兩炙微赤劉

黃連

一錢

右為散每服三錢以水一中盞入棗二枚煎至六分

去滓不計時溫服

前胡散

出聖惠方

治傷寒五日後熱結胸氣不散湯飲難下腹

脹悶宜服

前胡

一兩去蘆頭

當歸

半兩剉碎微炒

川大黃

剉碎微炒

羌活

檳

榔

三分桔梗

去蘆頭各一兩

郁李仁

一兩湯浸去皮尖微炒

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

大黃散

出聖惠方

治傷寒十餘日熱氣結於胸中往來寒熱

頭痛宜服

川大黃

剉碎微炒

柴胡

去苗

川朴硝

赤芍藥

黃芩

各一

兩

枳實

微炒

虎掌

微炒各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒結胸氣噎塞煩悶宜服此方賺胸散

出十便良方

枳實

麩炒微黃

桂心

各一兩

右為散每服以溫水調下二錢不計時候

治傷寒結胸內有瘀血大便秘不利小腹滿急宜服

出聖惠方

桃仁

半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

水蛭

炒令微黃

赤蟲

炒令微黃各一分

川大黃

一兩剉碎微炒

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計

時候溫服

桔梗散

出聖惠方

治傷寒結胸不下飲食四肢煩勞宜服

桔梗

去蘆頭

桑根白皮

剉

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襴

人參

去蘆頭

赤茯苓

各一兩

木香

檳榔

各半兩

赤芍藥

白朮

各三

分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分不計時候溫服

牛膝散

出聖惠方

治傷寒結胸腹中痞痛心下硬如石按之

煩悶宜服

牛膝

去蘆

大黃

剉碎微炒

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襖

郁李仁

湯浸去皮尖微

炒各三分

桂心

附子

炮製去皮臍

甘草

炙微赤剉

白朮

各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

恒山湯

出聖惠方

治傷寒結胸煩滿喘息稍急湯飲不下宜

服

恒山 甘草

生用各一分

蜀漆

犀角屑

各半

右剉為散以水一大盞煎至五分去滓不計時候頓

服須臾當吐為效

木香散

出聖惠方

治傷寒熱結不散胸中痞滿欲成結胸宜

服

木香

二分

赤茯苓

紫蘇莖葉

各三分

旋復花

陳橘

皮

湯浸去白穢焙

檳榔

各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

人參丸

出聖惠方

治傷寒結胸心膈燥悶宜服

人參

去蘆

白朮

甘草

炙

蘇蘇根

赤茯苓

牡蠣

燒為粉
各一兩

犀角屑

半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以粥飲送

下三十丸

鼈甲丸

出聖惠方

治傷寒結胸煩悶熱毒氣結聚不散宜服

鼈甲

一兩塗醋炙
令黃去裙襴

甘草

半兩炙
微赤剉

防葵

訶梨勒皮

人參

去蘆頭

桂心

白朮

川大黃

剉碎炒

郁李仁

湯浸

去皮尖微

炒各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫生薑

湯下三十九

芍藥散

出聖惠方

治傷寒結胸心下結硬煩悶腹脹宜服

赤芍藥

訶梨勒皮

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襴

人參

去蘆頭

黃芩

木香

郁李仁

湯浸去皮尖微炒已上各三分

白朮

桂

心

枳殼

麩炒微黃去穢

當歸

剉炒已上各半兩

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙

仁麩炒

微黃

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

赤茯苓丸

出聖惠方

治傷寒心中堅硬兩脇脹滿欲成結胸

宜服

赤茯苓

桔梗

去蘆頭

赤芍藥

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襖

牛

膝

去苗

枳殼

麩炒微黃去核

五味子

五加皮

柴胡

去苗

桂

去苗

心

川大黃

剉碎微炒已上各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫生薑

湯下三十丸

硃砂丸 治傷寒心中硬痛不可忍或腹脹滿欲成結

胸宜服

硃砂

一兩細研
水飛過

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁
麩炒微黃別研如膏

麝香

一分

細研

右同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫

生薑湯送下二十丸

太乙丹 治傷寒結胸心下痞硬不通

禹餘糧

醋滓

玄精石

金星石

銀星石

陽起石

紫石英

白石英

甘錫石

磁石

火煨醋滓七適

礞石

消石

硫黃

各一兩研

丹砂

乳香

膩粉

各半兩研

阿魏

錢巴豆

去皮生用

杏仁

湯浸去皮尖雙仁各七十二粒

右搗研細羅為末糯米飯和丸如彈子九大每服一

九麩炭火上燒存性入膩粉一錢蜜水化下吐瀉

脚轉筋伏陰厥逆生薑蜜水化下

黃連梔子湯

出濟生拔萃方

治傷寒汗下後熱結胸中大便秘

澀小便赤者

黃連 大黃 梔子 黃芩

各五錢

右剉細每服一兩水三盞煎服

桔梗連翹湯

出濟生拔萃方

治傷寒汗下後熱結胸中者

桔梗 連翹 黃芩

各一兩

薄荷 甘草 川芎

各五錢

錢 梔子

一個

右剉細每服一兩水三盞煮至一盞去滓溫服

治結胸糖炙法

出衛生家寶方

右以冰糖不拘多少置病人胸上其糖乾再塗病愈

則止

仙茅丸

出王氏博濟方

治結胸傷寒及惡候者大效

仙茅

一分

貫衆

半兩

黑附子

半兩炮去皮臍

草撥

一分

巴豆

半兩去皮

心甘草

少許

乾薑

半兩

右為細末麴糊和丸如梧桐子大下結胸生薑棗湯

下一丸如五七日病者更打破一丸同前湯使下

如常式傷寒只冷漿水下如轉後須用順氣散表藥服之汗出即差

治傷寒結胸陰症渾身手足俱冷并冷汗出胸前結伏噎塞不通大便虛冷須是陰症方可喫此藥

出護命方

草豆蔻 乾薑 黃橘皮 川芎 羌活 桂心

細辛

各一分

熟牽牛

炒

半夏

各三錢

右為細末每服三錢七分空心熟湯調下

治傷寒後寒熱已退腹中餘一塊疼痛不可勝忍忽走

在腿面上痛宜服此方

水護
命方

黃芩 牡丹皮 桑寄生 羌活 荊芥穗 射

干 芍藥 桃仁 牽牛 麻黃

去根各
一分

連翹

兩半

官桂

半
分

右為細末每服二錢半食後熟湯調下

增損理中丸

出活
人書

太陰下之胸滿硬諸結胸宜服此

人參 白朮

各一
兩

甘草 乾薑

各一
兩半

黃芩

兩半

枳實

二兩

右為細末煉蜜和如彈子大沸湯化一丸

稀涎散

出危氏方

治結胸膈作為寒熱飲食減少

猪牙皂角 圓白半夏

各一兩

右剉為散每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服
入咽便吐去涎即愈



普濟方卷一百四十一